

# PYELONEPHRITE CHEZ LA FEMME ENCEINTE

Pyélonéphrite chez la femme enceinte = **HOSPITALISATION**

## 1. Diagnostic et bilan d'admission :

- Bandelette urinaire
- CBU – antibiogramme (après toilette, en fin de jet)
- PV
- 3 hémocultures avant antibiothérapie
- NF, Iono, bilan hépatique
- Echographie rénale.

## 2. Boissons abondantes :

- 2 litres/j, répartis sur toute la journée

## 3. Traitement antibiotique

- **ROCEPHINE® Ceftriaxone : 1 à 2 g/j** en fonction de la sévérité de la scène clinique et du poids de la patiente, jusqu'à défervescence thermique (48h après apyrexie) et pendant au moins 4 jours
- **OROKEN® Céfixime : 200 mg – 1cp matin et soir**  
Traitement 2 à 3 semaines  
Prévoir uroculture et compte de germes à 48 h et à l'arrêt du traitement

**En cas d'allergie :**  
**AMIKLIN®** 15 mg/kg/24 h  
Perfusion intraveineuse lente jusqu'à l'apyrexie (durée <5 jours)

Adapter le traitement éventuellement : en fonction de l'**antibiogramme**

**Si récidive en cours de la grossesse :** traitement préventif, par antiseptique urinaire  
**NIBIOL®** Nitroxoline