COLIQUE NEPHRETIQUE ET GROSSESSE

I
Colique néphrétique simple

II
Colique néphrétique hyperalgique

III
Colique néphrétique fébrile

Objectifs :

Calmer la douleur
Confirmer le diagnostic

Envisager une dérivation :
- **Sonde urétérale**
- **Néphrostomie per cutanée**

C.A.T.

24 premières heures :

- **Traitement antalgique IV**
  - Paracétamol
  - Morphine (sans sulfite)
  - Nubain

En continu et à adapter à l'échelle d'évaluation de la douleur

- **Restriction hydrique**
- **Bandelette urinaire**
- **Tamisage des urines**
- **Prévoir :**
  - ECBU
  - Echo

ECBU

- **Hémocultures**
- **Antibiotiques**
- **Avis urologique**

Ultérieurement :

- **Si amélioration :**
  - Boissons +++
  - Faire Echo
  - Départ
- **Si amélioration :**
  - AINS avant le 6ème mois
  - Ketoprofène Profénid 100 mg IV en 20 mn
  - 2 à 3 fois/j pendant 24 H
- **Si persistance = CN hyperalgique :**

Avis urologue :

- **Colique néphrétique fébrile**
- **Echographie**
  . calculs bilatéraux
  . calcul > 6 cm
  . rupture de la voie excrétrice