

NOVANAT

HEMORRAGIES DU 1^{er} TRIMESTRE DE LA GROSSESSE

Éliminer une grossesse extra utérine

-Examen au spéculum :

-Pathologies cervicales : cervicite, polype, cancer
(Vérifier le dernier frottis cervico vaginal)

- Saignement utérin –demander une échographie en urgence

1) grossesse évolutive avec décollement visible ou non
Contrôle échographique à 10 jours pour suivi évolutif

2) grossesse arrêtée certaine adresser à la structure de soins pour prise en charge

3) suspicion de GEU adresser à la structure de soins pour prise en charge

A SAVOIR : métrorragies du 1^{er} trimestre = 50% de fausse couche

Gamma globuline anti D si patiente RH (-)

NOVANAT

HEMORRAGIES DU 2^{ième} et 3^{ième} TRIMESTRE DE LA GROSSESSE

1) Evaluer l'importance de l'hémorragie :

Le sang extériorisé n'est pas forcément représentatif de l'importance du saignement+++ (hématome rétro placentaire...)

Retentissement hémodynamique

2) Vérifier le retentissement fœtal :

Enregistrement du rythme cardiaque fœtal

3) Examen au spéculum :

Diagnostiquer l'origine du saignement

Sauf causes banales cervicales (ectropion, saignement post examen clinique ou rapport)

Adresser la patiente à la structure de soins sans délai

Echographie de contrôle

-Anomalies placentaires

Placenta prævia

Décollement placentaire

Décollement décidual

Placenta normal

Pas de décollement

Eliminer une rupture

prématurée des membranes