


TOXOPLASMOSE MATERNELLE ET CONGÉNITALE

2. CAT à la naissance – enfant suspect ou atteint



Malocide®	Pyriméthamine	1 mg/kg/j en 1 prise
Adlazine®	Sulfadiazine	100 mg/kg/j en 2 prises
Lederfoline 50®	Acide folinique	50 mg ou 2 x 25 mg/7 j
OU		
Fansidar®	Pyriméthamine	1,25 mg/kg/10 j
	Sulfadoxine	25 mg/kg/10j
Lederfoline 25®*	Acide folinique	50 mg ou 2 x 25 mg/7 j

2. Surveillance pendant le traitement

<ul style="list-style-type: none"> ▶ NFS J 0, J puis mensuelle PN < 1000 I mm³ Arrêt ttt anti toxoplasmique et poursuite acide folique ▶ Protéinurie/mensuelle sous Malocide et Adiazine ▶ Surveillance clinique, ophtalmo, sérologique/3 mois 	<ul style="list-style-type: none"> PN > 1000 I mm³ reprendre le ttt
<i>Des négativations transitoires de la sérologie peuvent survenir sous traitement : ne pas en tenir compte</i>	

3. Après l'arrêt du traitement

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Surveillance clinique, ophtalmo et sérologique - tous les 6 mois jusqu'à 2 ans - puis tous les ans à vie ▶ En cas de rebond - sérologie trimestrielle - fond de l'œil trimestriel
<p>Traitement</p> <ul style="list-style-type: none"> . en cas de lésion active ou de récidive . 3 mois et contrôler la cicatrisation

* Lederfoline 50 remboursé si prescrite par médecin hospitalier – à la pharmacie centrale des hôpitaux